



# APISTAN

## Posologie et voie d'administration

*Tau-fluvalinate .....0.8g*

### **Posologie :**

2 lanières par ruche (soit 2 x 800 mg de tau-fluvalinate, sous forme lanière) pendant 6 à 8 semaines.

### **Mode d'administration :**

Les lanières sont assemblées l'une à l'autre à la fabrication. Il suffit de les séparer et de les insérer entre les cadres du corps de ruche, les lanières seront maintenues verticalement entre les cadres, par leur système de suspension incorporé.

Utiliser 2 lanières pour une ruche type Dadant (10 cadres). Insérer les lanières entre les cadres 3 et 4 et entre les cadres 7 et 8 du corps de ruche.

Pour les nucléi et les petites ruches, 1 seule lanière est suffisante, à insérer entre les cadres, au coeur de l'essaim.

## **Durée de traitement :**

Les lanières doivent être laissées dans la ruche pendant une durée minimale de 6 semaines et retirées impérativement après 8 semaines de présence dans la ruche.

Compte tenu de l'évolution du parasite, un seul traitement par an est généralement suffisant.

Ce produit peut être utilisé toute l'année. Toutefois, les meilleurs résultats sont obtenus avec des traitements effectués au printemps avant la première miellée ou à l'automne après la récolte de miel.

Ne pas réutiliser les lanières.

## **Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux :**

Porter des gants et éviter de boire, manger ou fumer lors de la manipulation des lanières.

Se laver les mains avec du savon après utilisation.

En cas d'exposition accidentelle avec les yeux, rincer à l'eau avec soin.

## **Alternance du traitement.**

**Pour empêcher le développement de résistances aux médicaments, il est important de changer régulièrement de type de traitement.**

**Ne pas l'utiliser plus de deux ans de suite.**